

Dijetetski proizvod - hrana za posebne medicinske namene

Sastojci: glukozni sirup u prahu, prečišćena biljna ulja (suncokretovo ulje sa visokim stepenom oleinske kiseline, kokosovo ulje uljane repice i suncokretovo ulje), L-arginin, L-aspartat, L-leucin, L-fizin-acetat, L-glutamin, L-prolin, estri limunske kiseline

[illegible]

Način upotrebe: Odojčad uzrasla do 1 godine: Jednu mericu praška treba rastvoriti u 30,0 ml vode. Količina praška za pripremu hrane i razređenje mora biti propisano od strane lekara/stručne osobe. Puna priložena merica sadrži oko 4,5 g praška. Ukoliko je potrebno, koristiti preciznu vagu. Dodati jednu ravnu mericu na svakih 30 ml vode, čime se postiže preporučena koncentracija od 13,5 w/v, odnosno osmolalnost od 340 mOsmol/kgH₂O.

Priprema obroka Neocate LCP: 1) Oprati ruke i očistiti radnu površinu. Oprati i sterilisati bočicu i cuclu. 2) Svežu pitku vodu prokuvati najmanje 5 minuta i ostaviti da se ohladi

3) Napuniti priloženu mericu sa Neocate LCP praškom do vrha. Perzistentni prašak ručnom stranom pažljivo tako da se odstrani višak praška iznad površine merice. 4) Ulići bočice

praskom do vrha. Poravnati prask ravnom stranom noža, tako da se odstrani višak praska iznad površine merice. 4) U bočicu sipati potrebnu zapreminu vode. Dodati propisani broj merica u odmerenu količinu vode. Zatvoriti bočicu i dobro promućkati, dok se prah potpuno ne rastvori. Na bočicu stavite sterilisanu čuclu. Pre branjenja još jednom proverite temperaturu prijemne vode.

Injunktiva za hranjenje: Zdravlje Vašeg deteta zavisi od strogo pridržavanja Injunktiva za prijemnik.

Upozorenje: Zdravlje Vašeg deteta zavisi od sigurnog pridržavanja uputstva za pripremu i upotrebu. Nepravilna priprema i upotreba može naškoditi Vašem detetu. Obrok uvek pripremati neposredno pre hranjenja. Ne zagrevati do ključanja i ne koristiti mikrotalasnu pećnicu. Pravilna higijena zuba je važna za zdravlje Vašeg deteta, a produžen kontakt zuba sa hranom i pićem povećava rizik od karijesa. Obavezno oprati zube detetu nakon večere.

Uзраст deteta	Težina deteta (kg)	Broj merica	Količina vode (ml)	Broj obroka po danu (24h)
0 meseci	3,5	3	90	6-7
2 meseca	5,5	5	150	5-6
3 meseca	6	6	180	5
5 meseci	7,5	7	210	4-5
7 meseci	8,5	7	210	4
10 meseci	9	8	240	3

Odojče može zahtevati veću, ili manju količinu od okvirno preporučene. Ukoliko se detetu uvodi i druga hrana, to činiti po preporuci stručnog lica i shodno tome smanjiti količinu Neolacte LCP obroka.

Napomena: DOJENJE JE NAJBOLJI NAČIN ISHRANE ZA BEBE. Pre upotrebe promućkati i koristiti na sobnoj temperaturi. Proizvod je nutritivno potpuna namirnica i pogodna za upotrebu kao jedini izvor hrane, ili kao dodatak uobičajenoj ishrani.

Uzimali osobu preosetljivu na neki od sastojaka proizvoda. Hrana za odgođac nije sterilna. Proizvod se mora koristiti pod nadzorom lekara.

Način čuvanja: Pakovano u zaštićenoj atmosferi. Čuvati u originalnom pakovanju, na tamnom i suvom mestu, na

Neto količina: 400 g **Proizvođač:** SHS International Ltd, 100 Wavertree Boulevard | Iweron | Z 9PT | United Kingdom

Neto količina: 400,0 g. Proizvođač: SNS International Ltd., 60 Waverley Boulevard, Liverpool L7 9P1, United Kingdom.

Broj i datum upisa u bazu podataka Ministarstva zdravlja Republike Srbije: 14516/2024 od 01.07.2024.

Sadržaj aktivnih komponenti	100,0 g p graha	100,0 ml obroka
Vitaminski		
Vitamin A	431,0 µg RE	58,2 µg RE
Vitamin D3	11,8 µg	1,52 µg
Vitamin E	9,85 mg α-TE	1,33 mg α-TE
Vitamin C	52,7 mg	7,11 mg
Vitamin K1	44,7 µg	6,03 µg
Vitamin B1 (tiamin)	0,59 mg	0,08 mg
Vitamin B2 (riboflavin)	0,59 mg	0,08 mg
Vitamin B3 (niacin)	9,41 mg NE	1,27 mg NE
Vitamin B6	0,48 mg	0,06 mg
Vitamin B9 (folna kiselina)	68,5 µg	9,24 µg
Vitamin B9 (folat)	116,0 µg	15,7 µg
Vitamin B12	1,38 µg	0,19 µg
Vitamin B7 (biotin)	19,2 µg	2,59 µg
Vitamin B5 (pantotenska kiselina)	3,05 mg	0,41 mg
Mineralni		
Natrijum	212,0 mg	28,6 mg
Kalijum	536,0 mg	72,4 mg
Hlorid	586,0 mg	78,1 mg
Kalcijum	580,0 mg	77,3 mg
Fosfor	570,0 mg	49,9 mg
Magnezijum	52,0 mg	7,02 mg
Gvožđe	7,39 mg	1,0 mg
Bakar	0,42 mg	0,057 mg
Cink	5,42 mg	0,73 mg
Mangan	0,049 mg	0,007 mg
Iod	103,0 µg	14,0 µg
Molibden	11,3 µg	1,53 µg
Selen	18,7 µg	2,53 µg
Hrom	10,8 µg	1,46 µg
Ostalo		
-karnitin	10,8 mg	1,46 mg
Holin	137,0 mg	18,5 mg
Inozitol	110,0 mg	14,9 mg
Leucin	32,0 mg	4,32 mg
Tukoleidi	17,2 mg	2,33 mg
Osmolarnost	310 mOsmol/kg	
Osmolalnost	340 mOsmol/kg H ₂ O	

Nutritivne informacije (prosečan sastav)	100 g prah	100 ml mokra
Energetska vrednost (kJ / kcal)	2 065 / 493	279 / 67
Masti – ukupno (g)	25,6	3,5
od kojih zasićene masne kiseline (g)	10,1	1,4
od kojih monone zasićene masne kiseline (g)	11,4	1,5
od kojih polinezasićene masne kiseline (g)	7,1	0,58
od kojih linolenska kiseline (g)	3,3	0,45
od kojih alfa-linolenska kiseline (g)	0,33	0,045
od kojih arahidonska kiseline (g)	0,13	0,017
od kojih dokozahexaenska kiseline (g)	0,12	0,017
Ugljeni hidrati – ukupno (g)	52,7	7,1
od kojih šećeri (g)	4,6	0,62
Vlakna (g)	0	0
Proteini (g)	13,3	1,8
So (g)	0,53	0,07

NEOLCP400G1025